

## Ibuprofen sodium ออกฤทธิ์แก้ปวดได้เร็วกว่า ibuprofen ปกติ

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 โดย หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาประสิทธิภาพของตัวรับยา Ibuprofen ในรูปเกลือโซเดียม (ibuprofen sodium)

พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดคีรีชาจากความเครียด และอาการปวดฟัน ได้ดีเทียบเท่ากับ Ibuprofen รูปแบบปกติ แต่สามารถออกฤทธิ์ลดปวดได้เร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญ Ibuprofen sodium เพียงวันเดียวในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทำการค้า Advil®: Film-coat ประกอบด้วย ibuprofen sodium 256 มิลลิกรัม (เทียบเท่า ibuprofen 200 มิลลิกรัม)

โดยเม็ดยาเม็ดเดียวเคลือบบางกว่าเม็ดยาทั่วไป ทำให้ดูดซึมได้เร็วขึ้น

และจากการที่อยู่ในรูปเกลือทำให้ยานุภาพและแตกตัวเร็วขึ้นในกระเพาะอาหาร จากการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ พบว่า ibuprofen sodium มีอัตราการดูดซึมเร็วกว่า ibuprofen ปกติการศึกษาประสิทธิภาพในการลดอาการปวดฟันของ ibuprofen sodium ได้ทำในคนไข้ 316 ราย ที่มีอาการปวดฟันหลังการผ่าตัด โดยแบ่งคนไข้ออกเป็น 4 กลุ่มจากการสุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับ ibuprofen sodium 256 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ( $n=95$ ), กลุ่มที่ได้รับ Advil®: ibuprofen รูปแบบธรรมด้า 200 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ( $n=86$ ), กลุ่มที่ได้รับ Motrin®: ibuprofen รูปแบบธรรมด้า 200 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ( $n=87$ ) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ( $n=48$ ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับ ibuprofen sodium ใช้เวลาตั้งแต่ทานยาจนอาการปวดบรรเทาลง เคลื่อน 42.2 นาที ส่วนกลุ่มที่ได้รับ ibuprofen รูปแบบธรรมด้า ใช้เวลาเฉลี่ย 55.3 นาที

ในขณะที่ประสิทธิภาพในการลดปวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มที่ได้รับ ibuprofen sodium และ ibuprofen รูปแบบธรรมด้าในการศึกษาที่สอง ทำการศึกษาการใช้ ibuprofen sodium เพื่อบรรเทาอาการปวดคีรีชาจากความเครียด ทำการศึกษาในคนไข้ 226 ราย โดยแบ่งคนไข้ออกเป็น 3 กลุ่มโดยการสุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับ ibuprofen sodium 256 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ( $n=91$ ), กลุ่มที่ได้รับ ibuprofen รูปแบบธรรมด้า 200 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ( $n=89$ ) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ( $n=46$ ) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการลดปวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มที่ได้รับ ibuprofen sodium และ ibuprofen รูปแบบธรรมด้า แต่ ibuprofen sodium ออกฤทธิ์เร็วกว่า ibuprofen รูปแบบธรรมด้าประมาณ 0.5 ชั่วโมงไม่พบการรายงานอาการข้างเคียงจากยา ibuprofen sodium ในการใช้ลดอาการปวดคีรีชาจากความเครียด แต่พบรายงานการเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในการศึกษาที่ใช้ ibuprofen sodium ลดอาการปวดฟันหลังการผ่าตัด Key words: ibuprofen sodium, fast-acting film coated tablet, onset of action, absorption, efficacy, ยาเม็ดออกฤทธิ์เร็ว, เวลาในการออกฤทธิ์, การดูดซึม, ประสิทธิภาพ

Reference:

<http://www.medscape.com/viewarticle/810661>

Link:

-