

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยา leucotriene modifiers

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดย หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขอให้ Singulair®; Accolate®; Zflo®; และ Zflo CR®; เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อระวังในการใช้ยาเนื่องจากพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การมีพฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลง Singulair ใช้ในการรักษาโรคหืดและอาการของโรคภูมิแพ้ ส่วน Accolate®; Zflo®; และ Zflo CR®; มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคหืดเท่านั้น ยาทั้งสี่ตัวนี้เป็น leucotriene inhibitors ซึ่งออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการตอบสนองต่อการอักเสบในร่างกาย โดย FDA ได้รับรายงานจากผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้เกิดอาการทางจิตและประสาท (neuropsychiatric events) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอารมณ์ได้แก่ กระสับกระส่ายการรวบรัดวิตกกังวล ฝันร้าย เกิดภาพหลอน ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ฉุนเฉียวง่าย มีความคิดและพฤติกรรมในการฆ่าตัวตายและมีอาการอื่น ซึ่งจากการทบทวนการศึกษาของยาทางคลินิกยังไม่พบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย FDA จึงได้แนะนำในการใช้ยาว่าทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนักถึงอาการไม่พึงประสงค์ของยาดังกล่าวเมื่อมีการใช้ยา ผู้ป่วยควรพูดคุยกับผู้ดูแลรักษาเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นและควรพิจารณาหยุดยาเมื่อมีอาการทางจิตและประสาทเกิดขึ้นซึ่ง บริษัทผู้ผลิต Singulair®; จะได้ทำการปรับปรุงเอกสารกำกับยาเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อไป ขณะที่ Accolate®; Zflo®; และ Zflo CR®; ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวในเอกสารกำกับยา

Reference:

<http://www.medscape.com/viewarticle/704396>

Link:

-