

หากแพ้ Erythromycin ใช้ยา proctosedyl กรณีเป็นริดสีดวงทวารได้หรือไม่ เพราะเหมือนจะมี antibiotics เป็นส่วนผสมอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหน

ถามโดยคุณ กระแต ตอบโดย หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พรีอกโทซิดิล ชนิดยาเหน็บทวาร (Proctosedyl Suppository) เป็นยาที่ใช้รักษาโรดสีดวงทวาร เป็นยาสูตรผสมที่มี hydrocortisone 5 มิลลิกรัม, cinchocaine HCl 5 มิลลิกรัม, framycetin sulfate 10 มิลลิกรัม และ aesculin 10 มิลลิกรัม ซึ่งยา framycetin sulfate เป็นยาปฏิชีวนะ (antibiotic) จัดเป็นยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycosides) มีโครงสร้างต่างจากอีริโทรมัยซิน (erythromycin) ซึ่งเป็นยาในกลุ่มแม็กโครไลด์ (macrolides)

ความเสี่ยงในการแพ้ยาต่างชนิดกันมักเกิดกับยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน

และจากการสืบค้นข้อมูลไม่พบรายงานการแพ้ยาข้ามกลุ่มระหว่าง กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์กับกลุ่มแม็กโครไลด์

ดังนั้นหากแพ้ยาอีริโทรมัยซินจึงสามารถใส่ยาพรีอกโทซิดิลได้ Keywords: ยารักษาโรดสีดวงทวาร, อีริโทรมัยซิน, hydrocortisone, cinchocaine, framycetin, aesculin, erythromycin

#### Reference:

1. □ Proctosedyl. Mims.com. 2020. Available from: <https://www.mims.com/thailand/drug/info/proctosedyl>

2. □ Hypersensitivity reactions to macrolides, aminoglycosides, tetracyclines, clindamycin, and metronidazole. Uptodate.com. 2020. Available from:

<https://www.uptodate.com/contents/hypersensitivity-reactions-to-macrolides-aminoglycosides-tetracyclines-clindamycin-and-metronidazole>